



OPŠTA ANESTEZIJA ZA CARSKI REZ (CR) KRATAK INFORMATOR

Ovde ćete pronaći informacije o tome na koji način ćete biti uspavani za vreme opšte anestezije.

- Opšta anestezija je često neophodna za hitan carski rez ako nema dovoljno vremena da se primeni spinalna ili epiduralna anestezija.
- Biće vam postavljena igla, koja se naziva „intravenska kanila“, na ruci ili nadlanci .
- Jedan od rizika opšte anestezije je da kiselina iz želuca uđe u pluća dok spavate. Da bi se smanjio ovaj rizik, možda ćete dobiti injekciju u venu ili u mišić na nozi. Možda ćete dobiti da popijete lek protiv kiseline - antacid.
- U operacionoj sali, na lice će vam postaviti masku preko koje ćete udisati kiseonik. Možda ćete osećati pritisak na licu od maske, ali treba da znate da je važno da dobijete više kiseonika, neposredno pre operacije.
- Lekove za opštu anesteziju ćete dobiti preko intravenske linije prikačene za infuziju. Kako budete tonuli u san, možda ćete osetiti pritisak na vratu. Ovaj pritisak ima za cilj da zaštiti vaša pluća i disajne puteve, ako dođe do povraćanja.
- Vaš pratilac/suprug neće moći da bude prisutan u operacionoj sali, ali može biti u blizini.
- Kad se probudite, nalazićete se u „sobi za buđenje“ i moći ćete ubrzo da vidite vašu bebu.
- Kada se probudite, možda ćete osećati bolove u grlu i/ili mučninu. Ukoliko bude potrebno, dobićete dodatnu dozu lekova protiv bolova i protiv mučnine.

U Velikoj Britaniji, svake godine se izvede 17000 opštih anestezija kod porodilja za carski rez sa izuzetno malim brojem komplikacija. Pa ipak, postoje neki rizici i neželjeni efekti opšte anestezije. Oni su prikazani na drugoj strani ovog informatora.

RIZICI I NEŽELJENI EFEKTI OPŠTE ANESTEZIJE

Mogući problem

Koliko se često dešava ovaj problem

| | |
|---|--|
| Drhtavica | Često - 1 od 3 porodilje |
| Bolovi u grlu | Često - 1 od 2 porodilje |
| Osećaj mučnine | Često - 1 od 10 porodilja |
| Bolovi u mišićima | Često - 1 od 3 porodilje |
| Posekotine i modrice na usnama i jeziku | Povremeno -1 od 20 porodilja |
| Oštećenje zuba | Prilično retko - 1 na 4.500 porodilja |
| Anesteziolog ne može da plasira cev za disanje (tubus) kada zaspate | Ređe - 1 od 250 porodilja |
| Infekcija u grudnom košu | Često - 1 na 10 porodilja - ali većina infekcija nisu teške |
| Kiselina iz želuca ulazi u pluća | Prilično retko - 1 na 1.000 porodilja |
| Budnost u anesteziji tokom CR | Nije često - 1 od 400 porodilja |
| Teške alergijske reakcije | Retke - 1 na 10.000 porodilja |
| Smrt ili trajno oštećenje mozga | Smrt: Vrlo retko - manje od 1 na 100.000 (1-2 osobe godišnje u Velikoj Britaniji) Trajno oštećenje mozga: Vrlo retko - tačni podaci ne postoje |

Ne postoje precizni podaci za sve gore navedene rizike i neželjene efekte. Brojevi su rezultat procene i mogu varirati od ustanove do ustanove. Ako želite nešto da pitate ili vam je nešto nejasno, slobodno porazgovarajte o tome sa vašim anesteziologom.

**Možete dobiti više informacija ako preuzmete brošuru „Anestezija za carski rez“ sa vebajta
The Royal College of Anaesthetists
www.rcoa.ac.uk**

© Obstetric Anaesthetists' Association 2012
Registered Charity No 1111382
www.oaformothers.info

